



Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgA к Helicobacter pylori)

С инфекцией *Helicobacter pylori* ассоциированы такие заболевания как хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; возможна и бессимптомная форма инфекции.

Имеются данные, что *Helicobacter pylori* может быть причиной поражения сосудов сердца и мозга.

Возбудитель попадает в организм преимущественно с пищей. Циркулирующие антитела обычно представлены иммуноглобулинами класса IgG.

Системный IgA ответ обычно менее выражен, но может указывать на более сильное местное воспаление. В редких случаях у инфицированного человека может наблюдаться только IgA ответ.

Подготовка: Специальная подготовка не требуется. Рекомендуется взятие крови не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи.

Показания:

- Диагностика инфекции *Helicobacter pylori* у пациентов с гастритом, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
- Мониторинг эрадикации *Helicobacter pylori* после антибактериальной терапии.

Результаты выдаются в терминах:

- отрицательный;
- пограничный;
- положительный.

Положительный результат: инфекция *Helicobacter pylori*.

Отрицательный результат:

1. ранний период инфекции;
2. эффективная антибактериальная терапия;
3. состояние ремиссии;
4. отсутствие инфекции (при отрицательных результатах тестирования на IgG и IgM антитела).