



Ингаляционный аллергический профиль

Ингаляционная аллергическая панель:

- Береза
- Орешник
- Олива
- Дуб
- Платан
- Кипарис
- Тимофеевка
- Бермудская трава
- Подорожник ланцетолистный
- Амброзия полынолистная
- Полынь горькая
- Постенница
- Кошка
- Собака
- Лошадь
- Плесневые грибы: *Aspergillus fumigatus*
- Плесневые грибы: *Alternaria alternata*
- *Dermatophagoides pteronyssinus*
- *Dermatophagoides farinae*
- *Acarus siro*

Панель распространённых бытовых респираторных аллергенов предназначена для скринингового обследования с целью выявления значимых аллергенов при подозрении на аллергию, связанную с респираторными (поступающими при дыхании) аллергенами.

Результат выдаётся с указанием концентрации и класса IgE по каждому аллергену в отдельности.

Подготовка: Предпочтительно выдержать 4 часа после последнего приема пищи, обязательных требований нет. Исследование нежелательно проводить на фоне применения препаратов глюкокортикоидных гормонов (следует проконсультироваться с лечащим аллергологом относительно целесообразности отмены). Антигистаминные препараты не оказывают влияния на результат.

Повышение уровня:

1. аллергические заболевания;
2. сенсibilизация к аллергену без клинических проявлений;
3. проявление кросс-реактивности с другим аллергеном.