



Prom - Test
Laboratories

РА, г. Ереван
Кохбацц 28, Комитас 58,
Дзорапи 4/3, по соседству
с клиникой «Арамянц»
Тел.: / +374 60/ 44 58 58
Моб.: / +374 55/ 44 58 58
www.promtest.am

Лейшманиоз (антитела класса IgM/IgG)

Лейшманиоз - общее название группы болезней, вызываемых внутриклеточными паразитами из рода лейшманий и характеризуются хроническим течением, волнообразной лихорадкой, гепатоспленомегалией, панцитопенией (висцеральные формы) и специфическим поражением кожи (кожные формы).

Висцеральный лейшманиоз вызывается *L. donovani*, кожный - *L. tropica*. Возбудители проходят 2 стадии развития: тканевую безжгутиковую (амастигота) - в организме позвоночного животного или человека и подвижную жгутиковую (промастигота) - в переносчике.

Источником инфекции при висцеральном и сельском кожном лейшманиозе являются шакалы, лисицы, собаки и некоторые виды крыс, при индийском висцеральном кала-азари и городском каждому - также больные люди, у которых возбудитель в лихорадочный период находится в крови и на коже. Передача заболевания осуществляется с помощью москитов. Сезонность летне-осенняя. Восприимчивость всеобщая.

Подготовка: Специальная подготовка не требуется. Рекомендуется взятие крови не ранее чем через 4 часа после последнего приема пищи.

Показания: диагностика/ диффдиагностика лейшманиоза.

Единицы измерения: тест является качественным.

Референсные значения на бланках независимой лаборатории “Пром-Тест”.